

GUIA DE AVES DE MAR CHIQUITA

- ANSENUZA -



ESPECIES COMUNES Y SITIOS PARA SU AVISTAJE

Bañados del Río Dulce y
Laguna Mar Chiquita.
Provincia de Córdoba - Argentina
Walter E. Cejas - Erio Curto

2018





PRÓLOGO

El turismo en contacto con la naturaleza es una de las actividades de mayor crecimiento en todo el mundo, favorece la generación de empleo en zonas diferenciales y aporta a la conservación de la biodiversidad como un recurso sustentable.

Córdoba es una provincia llena de escenarios naturales fascinantes y desde la Agencia Córdoba Turismo apostamos permanentemente al desarrollo de actividades ecoturísticas como la observación y fotografía de aves silvestres, concentrándonos particularmente en nuestras áreas naturales protegidas.

La participación en eventos y en ferias nacionales e internacionales relacionadas con esta temática, el trabajo en la Comisión Científica de Áreas Naturales Protegidas y en la Unidad Ejecutora para la creación del Parque Nacional Ansenusa (el mayor humedal interior de Sudamérica) son una muestra de ese compromiso.

Libros como este, cuyos autores son biólogos estudiosos de la avifauna local, incentivan el interés del público general y ayudan a potenciar el desarrollo de Córdoba como un destino ecoturístico de nivel internacional. Los invito a recorrer las páginas de esta publicación para adentrarse en el fascinante mundo que nos presenta Mar Chiquita, en la diversidad de su fauna, en lo majestuoso de sus paisajes.

Cdr. Julio Bañuelos

Presidente Agencia Córdoba Turismo



AREA MAR CHIQUITA

Se trata de uno de los espacios priorizados en el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable (PFETS) - Argentina 2020, perteneciente a la Región Córdoba.

La actividad turística de la región tuvo un período de gran esplendor durante el siglo XX que se vio interrumpido a mediados de la década de 1970 debido a grandes inundaciones que arrasaron miles de hectáreas de campo y gran parte de Miramar, única localidad ubicada sobre las márgenes de la laguna. La infraestructura turística fue destruida casi en su totalidad por lo que fue necesaria su reconstrucción y adaptación a los nuevos niveles de Mar Chiquita. Desde hace varios años, el turismo se ha recuperado y se encuentra en franco crecimiento.

La región se caracteriza por una gran variedad de ambientes que sustentan una alta riqueza biológica lo que la transforma en un destino típico para las distintas modalidades de Turismo en la Naturaleza. Avalando esta condición, recientemente el Gobierno de la provincia de Córdoba firmó con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, un convenio de cooperación para avanzar en la creación del mayor parque nacional de nuestro país.

Si bien tradicionalmente el turismo estuvo vinculado casi con exclusividad a Miramar, desde hace varios años los municipios de Balnearia, La Para y Marull se han sumado decididamente a esta actividad, conformando la denominada Región de Ansenusa, organización en la que trabajan de manera coordinada pero manteniendo sus propias características.

Laguna Mar Chiquita

Se trata de un lago extremadamente variable. A partir de la década de 1970 su nivel experimentó un notable incremento debido a un marcado y sostenido aumento del régimen de lluvias que caen sobre su extensa cuenca, pasando su superficie de 200 000 ha a casi 700 000 ha. Junto con el área inundable ubicada al Norte del cuerpo de agua, constituyen la Reserva de Uso Múltiple Bañados del Río Dulce y Laguna Mar Chiquita. Esta área protegida de alrededor de un millón de hectáreas es administrada

por la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba.

Sus singulares características así como su elevada biodiversidad determinan que esta protección trascienda el ámbito provincial y sea reconocida como un humedal de importancia internacional por la Convención de Ramsar. Es considerada además un Sitio de Importancia Hemisférica dentro de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras y lago miembro de la ONG internacional Living Lakes con sede en Alemania.

Se trata de una laguna sedimentaria poco profunda (no más de 10 m) formada hace unos 50 000 años cuando una falla geológica de dirección Norte-Sur formó un dique natural que contuvo las aguas del río Dulce, su principal afluente proveniente del Noroeste argentino, y de los ríos Primero (Suquia) y Segundo (Xanaes) que nacen en las serranías cordobesas. Mar Chiquita es salada debido a que es una cuenca endorreica - sin salida al mar - por lo que el agua solo abandona el lago por evaporación, quedando acumulados los minerales aportados por los ríos a lo largo de miles de años.

Tanto su superficie como su salinidad, que presentan grandes variaciones, dependen del nivel de las aguas. A mayor nivel, mayor dilución y por ende, menor salinidad.

Este sitio Ramsar es el mayor lago salado de Sudamérica y uno de los más extensos del mundo. Se destaca fundamentalmente por la gran diversidad en el grupo de las aves, de las cuales se llevan registradas más de 350 especies, con más de 140 exclusivamente acuáticas. Es importante no sólo para las especies que lo habitan de manera permanente sino para aquellas que realizan migraciones periódicas, muchas de escala continental, que no podrían ser completadas si ecosistemas como éste fueran alterados de manera significativa.

En esta área protegida se registran tres de las seis especies de flamencos que habitan en el mundo y se han llegado a contabilizar más de 500 000 falaropos en su visita estival provenientes del hemisferio norte.




AVES MIGRATORIAS EN MAR CHIQUITA - ANSENUZA

Desde hace miles de años se repite un increíble fenómeno migratorio donde las aves viajan desde lugares extremos como el ártico canadiense, Alaska, la región andina o el sur de la Patagonia hasta la región de Ansenúza.

Aves rapaces, chorlos y playeros, flamencos y golondrinas entre otras especies, poseen increíbles adaptaciones que les permiten afrontar el gran desafío de la migración y sobrevivir en diferentes ambientes acuáticos y terrestres.

Un verdadero fenómeno biológico que ocurre anualmente y capta la atención de millones de turistas, fotógrafos y observadores de aves.





LA OBSERVACION DE AVES

La observación de aves es una actividad realizada por personas que buscan conocer, identificar o simplemente observar aves silvestres en situación de libertad, siempre en contacto con la naturaleza. El interés del hombre por conocer las características propias de las aves, sus colores, cantos, danzas y comportamientos, responde a la necesidad de identificar su entorno, estudiar y comprender mejor a la naturaleza, determinar el valor biológico de un área natural y su potencial educativo y turístico, entre otros. Es una actividad vinculada al Turismo en la Naturaleza que promueve la conservación de los ambientes y contribuye a fomentar una conciencia pública sobre la importancia de su preservación. Las aves son indicadores sensibles de la riqueza biológica y de las condiciones ecológicas del medio natural y permiten identificar rápidamente los cambios de la naturaleza que también afectan nuestro entorno. La ausencia de aves, o la reducción de ejemplares y especies, permite detectar que algo está afectando la "salud" del ambiente, por ejemplo la destrucción de hábitat, su contaminación o problemas con especies introducidas. Los observadores de aves buscan descubrir y visitar nuevos lugares para avistar especies que aún no conocen, privilegiando aquellos espacios que permitan disfrutar de una experiencia integral en un marco de calidad ambiental. La observación de aves, además del disfrute y la contemplación de la naturaleza, involucra otras actividades como caminatas al aire libre, realización de actividad física, expresión artística a través del dibujo o la fotografía, participación en programas de identificación, censos, conservación de aves silvestres y/o adopción de

especies amenazadas y la participación ciudadana para la puesta en valor de áreas naturales protegidas o en buen estado de conservación. Vale decir que se vincula fundamentalmente con el aspecto lúdico-educativo-social del hombre, se realiza generalmente en grupos de amigos o familiares y ha demostrado ser una vía para generar nuevas amistades con gente que comparte el mismo amor por la naturaleza. Desde el punto de vista turístico, especies convocantes por su belleza, rareza, singularidad o comportamiento, y grandes concentraciones reproductivas se convierten en fuertes atractivos, que con una buena gestión y un sistema de soporte propicio, se constituyen en hitos para la realización de Turismo en la Naturaleza. A su vez, la movilidad de las especies, sus migraciones y sus ciclos, dinamizan los espacios donde se llevan a cabo las observaciones, contribuyendo de esta manera en un desarrollo territorial distinto, más dinámico.



LA OBSERVACIÓN DE AVES EN ARGENTINA

Sudamérica se destaca entre los destinos preferidos a nivel mundial por los aficionados a la observación de aves, debido a la oferta de vastos territorios con altos niveles de conservación y ambientes de grandes contrastes. Además, casi un tercio de las 9.500 especies de aves del mundo habitan en esta región que cuenta además con gran cantidad de especies de carácter endémico (exclusivas de determinadas regiones). Los países más visitados por los observadores de aves internacionales son: Brasil, Ecuador, Argentina, Costa Rica, Colombia, Trinidad y Tobago, Perú y Chile.

En la República Argentina, algo más de 1.000 especies tienen presencia regular en el país (10% de las aves existentes en el planeta) ofreciendo un muestrario espectacular de la diversidad de aves observables principalmente en áreas naturales protegidas y ambientes específicos. Muchos constituyen hábitat de especies acuáticas como son los humedales, algunos de los cuales han sido declarados sitios de la Convención de Ramsar. Ciertos aspectos relevantes de esta actividad en nuestro país refieren a la posibilidad de practicarla durante las cuatro estaciones del año y en ambientes muy diversos. La variada geografía argentina y la existencia de diferentes climas, permiten definir 18 ecorregiones a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, cada una con un elenco particular de especies. En la provincia de Córdoba se han registrado unas 440 especies, que incluyen aves silvestres residentes y migratorias. (CejásW. 2018).

En los últimos años, el Ministerio de Turismo (MINTUR)

a través de la Subsecretaría de Desarrollo Turístico, ha realizado una apuesta al desarrollo de esta modalidad mediante la construcción de miradores, senderos y carteles interpretativos localizados principalmente en áreas naturales protegidas. El objetivo es facilitar el acceso de los visitantes a los puntos de interés para avistar aves y colaborar con información específica sobre las especies observables en la zona.

En esta región, el MINTUR desarrolló acciones en el marco del Programa de Fortalecimiento de Destinos Emergentes (PROFODE) realizando previamente un diagnóstico acerca de las potencialidades de este destino, en el cual participaron cuatro municipios de Ansenúza: La Para, Marull, Balnearia y Miramar. A su vez, la Agencia Córdoba Turismo estuvo involucrada en esta labor y participa activamente en distintos proyectos de desarrollo de Ecoturismo y la Observación de Aves, mediante el relevamiento constantes de las especies de la avifauna, el diseño de senderos de interpretación ambiental y material gráfico de promoción en ferias nacionales e internacionales. De esta manera, la provincia de Córdoba está representada desde hace varios años en la feria de aves más importante del mundo, la British Bird Fair (Rutland- Inglaterra), promocionando la actividad de la observación y fotografía de aves en la provincia y en especial de la Laguna Mar Chiquita, el área natural protegida de mayor diversidad avifaunística, en proceso de convertirse en el Parque Nacional más grande de Argentina, con más de 800.000 hectáreas.



Circuitos para la observación

Existen en la Región de Ansenúza varios sitios a los que se puede acceder para realizar observación de aves. Algunos son de libre acceso como Playa Grande, Laguna del Plata, Lomita de los Indios o Miramar, en tanto que en los balnearios ubicados en Laguna del Plata y el río Segundo (Xanaes) es necesario abonar una entrada (ver mapa en la contratapa de esta guía).



CIRCUITO LAGUNA DEL PLATA

S 30° 56' 08.50" O 62° 53' 25.90"

Se trata de un recorrido de 500 m de extensión de baja dificultad. Se accede ingresando al Camping Municipal Bahía de Ansenúza, ubicado sobre la Ruta Provincial N° 17 a 12 km al Este de La Para. Este sendero cuenta con 3 observatorios y cartelería de interpretación. Desde las plataformas de observación pueden apreciarse aves acuáticas en la bahía y aves de bosque y pastizal a lo largo del sendero. Además, las principales especies arbóreas y arbustivas están identificadas por lo que también puede utilizarse como sendero de interpretación de la flora autóctona.



OBSERVATORIO MIRAMAR



Se encuentra ubicado dentro del ejido urbano de Miramar, sobre el terraplén de la defensa costanera. Desde esta plataforma podrán apreciarse fundamentalmente aves acuáticas, entre las que se destacan flamencos, gaviotas, teros reales, chorlos y playeras. Si el nivel de la laguna es bajo, es posible emprender una caminata hacia el sureste a lo largo de la playa. No se trata de un sendero demarcado y aunque no presenta riesgos es recomendable ser precavidos, sobre todo en el verano por las altas temperaturas. Aproximadamente a 6 km llegaremos a la desembocadura del río Segundo (Xanaes), lugar de concentración habitual de gran cantidad de aves. En las cercanías de este sitio de alimentación se encuentra ubicado el Observatorio de Lomita de los Indios. Se recomienda precaución al acercarse a la costa debido a la presencia de barro muy espeso en el que personas y vehículos pueden quedar atrapados.

OBSERVATORIO LOMITA DE LOS INDIOS

A unos 6 km de Miramar se encuentra esta plataforma de observación construida en 2003 por el Centro de Zoología Aplicada de la UNC, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EEUU y la Municipalidad y la Cooperativa Eléctrica de Miramar, con fondos aportados por la ONG alemana Living Lakes.

Si bien fue levantado a orillas de la laguna, las constantes fluctuaciones de su nivel pueden

determinar que en ocasiones la costa quede a considerable distancia. No obstante brinda una panorámica interesante de los grandes grupos de alimentación que las aves forman frente a la cercana desembocadura del río Xanaes.

A este sitio puede accederse por caminos vecinales siguiendo las señales desde Miramar o bien, cuando el nivel de la laguna lo permite, caminando por la costas.



EQUIPO BÁSICO Y RECOMENDACIONES

Para observar aves en la naturaleza se requiere muy poco equipamiento. Además de aguzar la vista y el oído, idealmente se debe contar con:

- Anotador (libreta de campo)
- Lápiz
- Binocular o telescopio
- Guía de Aves

Según el Código Ético del Observador de Aves elaborado por la SEO/ BidLife International, sugerimos aplicar tanto en la observación y en la fotografía como en el estudio de las aves, los siguientes principios:

- El bienestar de las aves debe ser SIEMPRE lo primero
- El hábitat debe ser protegido, por lo tanto cuidar y ser respetuosos con el ambiente es vital para las aves.
- No alterar el comportamiento de las aves lo más mínimo, en especial en época de cría o durante la migración.
- Respetar los derechos de los dueños de los campos y otras propiedades privadas.
- No ingresar sin permiso previo y no salirse de los recorridos permitidos.
- Comparte tus citas con otros observadores locales.
- Cuando encuentres una especie de ave en peligro, informa a la Secretaría de Ambiente o a los autores de esta guía.

- Se recomienda: Llevar sólo lo imprescindible en una mochila pequeña, para dejar las manos libres.
- Protegerse de los insectos y el sol con vestimenta que cubra bien el cuerpo.
- Evitar los colores brillantes y llamativos.
- Llevar sombrero o gorra.
- Informarse bien de las características del destino
- Comer liviano.
- Llevar agua
- Envolver el equipo más sensible con una bolsa plástica.
- Salir en grupos de al menos tres personas pero no demasiado numerosos.
- Caminar en silencio.
- Nunca separarse del grupo sin previo aviso o acuerdo del resto.
- Evitar recorridos desconocidos. No acercarse a bordes peligrosos.
- Los horarios más adecuados son el amanecer y el atardecer.

ALCANCES DE ESTA PUBLICACIÓN

Existen en el mercado editorial obras de excelente calidad conocidas usualmente como "Guías de Aves" que presentan una compilación exhaustiva de todas las especies que habitan en determinado ambiente. Este material es un aliado indispensable para todos los que practican la observación de aves y nuestra publicación no pretende reemplazar esa bibliografía especializada. Esta obra, de distribución gratuita, recopila aquellas especies comunes que cualquier neófito en la materia puede encontrar en una salida de campo en la costa sur de la laguna Mar Chiquita. Cada especie se acompaña de una breve descripción realizada de una manera simple, omitiendo datos de sistemática, para hacerlo accesible a cualquiera. En aquellos casos en que fue necesario recurrir a términos específicos, los mismos han sido resaltados en negrita e incluidos en el glosario de la página 28. Se aclara que la distribución geográfica de las especies tratadas en esta guía, se tiene en cuenta sólo para los países de Sudamérica. Esperamos que este material sirva como una invitación para que más personas se sumen a la práctica regular de esta actividad apasionante que puede ser compartida por toda la familia.



Foto: Walter E. Cejas

INAMBÚ COMÚN (*Nothura maculosa*)

Descripción: 25 cm. Dorsal ocráceo manchado de pardo, abigarrado. Cabeza, cuello y pecho ocre, con estrías. Garganta blanca. Ventral canela con flancos barrados. Patas amarillentas. Iris amarillo anaranjado.

Hábitat: áreas abiertas con pastizales, cultivos y rastrojos en zonas serranas y llanuras.

Distribución geográfica: Bolivia, Paraguay, sudeste de Brasil, Uruguay y Argentina, hasta el noreste de Chubut.

Notas de interés: de presencia habitual en nuestros campos. Es una especie arisca y se mimetiza fácilmente entre los pastizales, levantando vuelo imprevista y ruidosamente. Conocida con el nombre de "perdiz", se cruza en caminos y rutas, siendo perseguida por el hombre, muchas veces acompañado por perros, con fines "deportivos".



Foto: Walter E. Cejas

MACÁ GRANDE (*Podiceps major*)

Descripción: 44 cm. Pico negro, largo y algo curvo hacia arriba. Cabeza con cresta, línea posterior del cuello y dorso, negruzcas. Cuello largo, rojizo. Ventral blanco. Plumaje no reproductivo: más discreto; dorso pardo y vientre blanquecino.

Hábitat: embalses, lagunas, bañados, esteros y ríos.

Distribución geográfica: desde Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile y Argentina, incluida Islas Malvinas.

Notas de interés: al igual que el Macá Común, posee hábitos acuáticos. Se zambullen en búsqueda de peces que constituyen su principal alimento o para escapar de predadores. Los pichones, con un bello diseño estriado pardo en cabeza y cuello, a veces son llevados en el dorso de sus padres. Emiten un melancólico sonido onomatopéyico, por lo que también se lo conoce con el nombre de Huala.



Foto: Walter E. Cejas

MACÁ COMÚN (*Podiceps rolland*)

Descripción: 23 cm. Fino y puntiagudo pico negro. Iris rojo. En época reproductiva: cabeza, cuello y dorso negros con ventral rojizo y penacho auricular blanco. En el período de reposo sexual: ventral blanco con el resto pardo oscuro y cara blancuzca con líneas oscuras.

Hábitat: diversos ambientes acuáticos como lagunas, bañados, esteros, embalses y ríos.

Distribución geográfica: desde Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, sudeste de Brasil, Chile y Argentina, hasta las Islas Malvinas.

Notas de interés: de hábitos exclusivamente acuáticos, se zambullen con gran agilidad para escapar de predadores o en búsqueda de peces que constituyen su principal alimento. Los pichones, con un bello diseño estriado pardo en cabeza y cuello, a veces son llevados en el dorso de sus padres.



Foto: Walter E. Cejas

BIGUÁ (*Phalacrocorax brasilianus*)

Descripción: 63 cm. Negro con dorso parduzco. Pico largo con gancho. Cola larga y rígida. Iris turquesa. En plumaje reproductivo, blanco en la base del pico y mechón auricular. Juveniles parduzcos, iris pardo.

Hábitat: en diversos ambientes acuáticos: lagunas, ríos, bañados, embalses, mares.

Distribución geográfica: Sudamérica hasta la Patagonia.

Nota de interés: especie gregaria, nidifica en árboles cerca del agua, formando grandes colonias. Se alimenta de peces como pejerreyes, bagres y anguilas a los que captura buceando. Luego se posan con las alas extendidas, para secarse al sol, ya que no tiene capacidad de impermeabilizar su plumaje como ocurre en otras aves acuáticas.

GARZA BLANCA

(*Ardea alba*)

Descripción: 65 cm. Pico e iris amarillo. Plumaje blanco con patas negras. En plumaje reproductivo, largas plumas blancas en la nuca, pecho y dorso (Egretes)

Hábitat: lagunas, esteros, bañados y costas del mar, embalses y ríos.

Distribución geográfica: toda Sudamérica hasta las Islas Malvinas

Notas de interés: es una especie común que posee hábitos arborícolas donde nidifica en colonias, también entre juncos. Consume peces y anfibios de gran tamaño acechándolos inmóvil o caminando lentamente.



Foto: Walter E. Cejas

GARCITA BLANCA

(*Egretta thula*)

Descripción: 40 cm. Plumaje blanco. Iris amarillo. Pico y patas negros con dedos amarillos. En plumaje reproductivo, largas plumas blancas en nuca, pecho y dorso (Egretes).

Hábitat: en diversos ambientes acuáticos: lagunas, ríos, bañados, embalses.

Distribución geográfica: Sudamérica. En Argentina (excepto Tierra del Fuego) hasta las Islas Malvinas.

Notas de interés: nidifica en juncos o en árboles. Se alimenta principalmente de renacuajos y pequeños peces, como mojarras y orilleros, buscándolos activamente o acechándolos inmóvil. Asociada también a cuerpos de agua urbanos. Es una especie más bien solitaria, aunque a veces se observan varios individuos.



Foto: Walter E. Cejas

GARCITA AZULADA

(*Butorides striatus*)

Descripción: 34 cm. Iris amarillo. Pico negruzco. Corona y plumas nucales negras. Coloración general gris azulado, con cuello ventral ocráceo estriado de canela. Patas amarillas. Los juveniles son grisáceos parduzcos con marcado estriado ventral.

Hábitat: en diversos ambientes acuáticos: lagunas, ríos, bañados, embalses.

Distribución geográfica: Sudamérica. En Argentina hasta el norte de Río Negro.

Notas de interés: nidifica en juncos o en árboles cerca del agua. Se alimenta generalmente de renacuajos, ranas, mojarras y orilleros, acechándolos inmóvil. A veces, posadas en alguna rama a escasos centímetros de la superficie del agua, se inclinan en forma vertical con un movimiento brusco para capturar sus presas.



Foto: Walter E. Cejas

CUERVILLO DE CAÑADA

(*Plegadis chihi*)

Descripción: 40 cm. Pico largo, delgado y curvo. Cuello y patas largas. En plumaje reproductivo, cara roja con borde blanco; cuerpo castaño-rojo con alas, cola y corona verde oscuro y con brillo. En reposo sexual el plumaje es pardo con cuello manchado de blanco.

Hábitat: bordes de lagunas, bañados, esteros y áreas rurales

Distribución geográfica: Bolivia, Paraguay, sudeste de Brasil, Uruguay y Argentina, hasta Santa Cruz.

Notas de interés: suelen observarse en grandes bandadas volando en forma de "V". Se alimentan de insectos y otros organismos en campos de cultivo y detrás de los arados. También en las márgenes de ambientes acuáticos. Nidifican entre los juncos




Foto: Walter E. Cejas



Foto: Walter E. Cejas

CIGÜENA AMERICANA

(*Ciconia maguari*)

Descripción: 85 cm. Blanca con el tercio posterior del cuerpo y cola, negro. Parte de la cara desnuda. Patas rojas. Iris amarillo. Pico recto, agudo y robusto, gris con punta rojo violáceo. Juveniles oscuros.

Hábitat: lagunas, esteros, bañados y áreas rurales.

Distribución geográfica: centro y Este de Sudamérica hasta el norte de Chubut. También en las Islas Malvinas.

Notas de interés: además de peces y anfibios, consume serpientes y ratones, por lo que es apreciada por el hombre de campo. Nidifica entre juncos, sola o en colonias. Suele formar grupos numerosos. A veces vuela muy alto, planeando en círculos como lo hacen las rapaces.



Foto: Walter E. Cejas

JOTE CABEZA NEGRA

(*Coragys atratus*)

Descripción: 53 cm. Negro. Punta de alas (base de primarias) de color blanco, visible en vuelo. Cabeza negruzca, sin plumas. Patas blancas.

Hábitat: selvas, bosques, áreas rurales y acuáticas, costas de mar y zonas urbanas.

Distribución geográfica: Sudamérica excepto Chile. En Argentina hasta Santa Cruz.

Notas de interés: de hábitos principalmente carroñeros, cumplen un rol ecológico muy importante en nuestros campos, siendo comunes y a veces abundantes. Aprovechando las cálidas corrientes de aire ascendentes, suelen observarse volando a grandes alturas describiendo círculos, desde donde pueden divisar su alimento.



Foto: Walter E. Cejas

FLAMENCO AUSTRAL

(*Phoenicopterus chilensis*)

Descripción: 70 cm. Plumaje de coloración rosada cubriendo las primarias de color negro. Pico con la mitad basal amarilla y la mitad distal negra. Patas gris-celeste con articulaciones y dedos rojos.

Hábitat: lagunas, bañados y estuarios, preferentemente de aguas salobres o saladas.

Distribución geográfica: desde Ecuador hasta Argentina.

Nota de interés: son bastante gregarios, concentrándose miles de individuos en áreas pequeñas. Es el flamenco más común y abundante en nuestro país, siendo la laguna Mar Chiquita el humedal más importante como sitio de nidificación y alimentación.

Colocan sólo 1 huevo de color blanco en nidos construidos con barro, con aspecto de cono truncado de unos 20 a 30 cm de altura. Las crías de esta especie emblema de la región fueron capturadas en grandes números para venderlas como mascota.



Foto: Walter E. Cejas

PARINA GRANDE (Flamenco Andino)

(*Phoenicoparrus andinus*)

Descripción: 75 cm. Plumaje rosado carmín, con el tercio posterior del cuerpo negro. Patas amarillas. Ojo pardo con periocular amarillo. Pico negro con la mitad basal amarillento y mancha rojiza. Los juveniles, de coloración general parda, con pico y patas negruzcas.

Hábitat: lagunas altoandinas. En invierno, en zonas de playas barrosas e interior de lagunas de agua salobres o saladas de llanuras, principalmente sin vegetación.

Distribución geográfica: Perú, Bolivia, Chile y Argentina. En Córdoba es escaso y llega como migratorio en otoño-invierno, aunque algunos ejemplares se observan todo el año en la laguna Mar Chiquita.

Notas de interés: es una de las especies de flamencos considerada VULNERABLE. En la laguna Mar Chiquita, pueden observarse ejemplares anillados en la región andina. Algunos individuos se han observado aquí durante todo el año. Al igual que otros flamencos, se alimentan de algas y pequeños crustáceos.

PARINA CHICA (Flamenco de James)

(*Phoenicoparrus jamesi*)

Descripción: 62 cm. Coloración rosada muy llamativa. Patas rojas. Tercio posterior del cuerpo, negro. Pico grueso y corto, amarillo con ápice negro. Ojo amarillo con periorcular y loreal rojo. En plumaje no reproductivo, blancuzco con patas amarillentas. Juveniles: plumaje y patas grisáceos. Hábitat: lagos y lagunas salobres.

Distribución geográfica: lagunas altoandinas de Perú, Bolivia, Chile y Argentina.

Notas de interés: esta especie, la menor de los flamencos, también es capturada con fines comerciales de manera ilegal. Está considerada AMENAZADA. En Córdoba es escasa, aunque en Mar Chiquita, desde los últimos años, se la ha observado de manera permanente.

En época de apareamiento, caminan "danzando" rápidamente en grupos moviendo la cabeza de un lado a otro al mismo tiempo.



Foto: Walter E. Cejas

CHAJÁ

(*Chauna torquata*)

Descripción: 85 cm. Plumaje gris con un collar negro y otro blanco. Cara y espolones rojos en alas largas y anchas. Alas por ventral, blancas y negras. Patas rojo-rosáceas. Cresta nual gris. Pico corto como de gallina.

Hábitat: ambientes acuáticos en general, preferentemente con vegetación flotante y emergente. También en campos cultivados cercanos al agua y zonas arboladas.

Distribución geográfica: Sureste de Brasil, Paraguay, Sur de Bolivia, Uruguay y Argentina.

Notas de interés: de régimen herbívoro, los chajáes emiten fuertes gritos onomatopéyicos. Posan en árboles, planean, vuelan lento y a veces muy alto. Nidifican entre juncos y los pichones, generalmente cinco, poseen color amarillo.



Foto: Walter E. Cejas

SIRIRÍ PAMPA

(*Dendrocygna viduata*)

Descripción: 38 cm. Mitad anterior de la cara y garganta blanca, resto de la cabeza y cuello superior, negro. Base de cuello y pecho, castaño rojizos. Flancos con fino barrado blanco ocráceo y negro. Centro del vientre, rabadilla, cola y ventral de alas, negro. Juveniles con mitad anterior de la cara, acanelada.

Hábitat: lagunas, esteros, cunetas, bañados y áreas rurales adyacentes.

Distribución geográfica: Sudamérica. En Argentina hasta el Sur de La Pampa y Buenos Aires.

Notas de interés: especie muy conocida por su abundancia y colorido plumaje. Se desplaza volando, aún de noche, emitiendo su onomatopéyico silbo trisilábico similar a un "siriri". De día comúnmente se lo ve posado, cerca del agua.



Foto: Walter E. Cejas

COSCOROBA

(*Coscoroba coscoroba*)

Descripción: 65 cm. Pico y patas rojo-rosáceos. Iris anaranjado. Plumaje blanco con las puntas de las alas de color negro, visibles en vuelo. Juveniles similares a los adultos pero manchados de pardo.

Hábitat: lagunas, embalses y otros ambientes acuáticos.

Distribución geográfica: Sudeste de Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina, hasta las Islas Malvinas.

Notas de interés: gregarios, emiten un trompeteo onomatopéyico similar a "cooc-corob". Nidifica en grandes nidos hechos con juncos con una rampa de acceso. Especie en expansión geográfica.




Foto: Walter E. Cejas




Foto: Walter E. Cejas

CISNE CUELLO NEGRO

(*Cygnus melancoryphus*)

Descripción: 80 cm. Blanco, con cabeza y cuello negros. Sobre el pico grisáceo, carúncula roja-rosada. Línea blanca detrás del ojo. Patas rosadas. Los juveniles presentan coloración parda y cuello grisáceo.

Hábitat: diferentes ambientes acuáticos, como lagos, lagunas, embalses y costas del mar.

Distribución geográfica: Paraguay, Sudeste de Brasil, Uruguay, Chile y Argentina hasta Tierra del Fuego.

Notas de interés: nidifica en grandes plataformas construidas con vegetación acuática. Pichones totalmente blancos. En el pasado, sufrieron capturas con fines comerciales que redujeron notablemente sus poblaciones.




Foto: Walter E. Cejas

PATO GARGANTILLA

(*Anas bahamensis*)

Descripción: 35 cm. Cara y garganta, blancas. Pico plumbeo con base roja. Coloración general canela, dorso manchado y ventral moteado de negro. Alas pardo oscuro por dorsal, con banda alar verde brillante con laterales canela. Cola larga y puntiaguda, blanquecina.

Hábitat: lagunas, esteros, bañados, embalses y costas marinas.

Distribución geográfica: Sudamérica. En Argentina hasta las Islas Malvinas.

Notas de interés: fácilmente identificable desde lejos por su notable garganta blanca. Suele ser muy común y gregario. Nidifica en el suelo o entre los juncales, poniendo hasta doce huevos de color crema.



Foto: Walter E. Cejas

PATO BARCINO

(*Anas flavirostris*)

Descripción: 33 cm. Coloración general pardo oscuro, con vientre blanquecino. Pico amarillo con parte media superior (culmen) y punta (uña) negros. Cuello corto. Cabeza más oscura, con plumas nucales largas. Alas con banda alar negra y verde, con laterales con coloración canela oscuro y ocrácea.

Hábitat: lagunas, esteros, bañados, embalses, ríos y arroyos serranos.

Distribución geográfica: Sudamérica. En Argentina hasta las Islas Malvinas.

Notas de interés: especie similar al Pato Maicero pero más oscuro y pequeño. Emite un suave y corto silbido. Nidifica en el suelo, en huecos de árboles y barrancas, o en nidos abandonados de otras aves.



Foto: Walter E. Cejas

PATO CUCHARA

(*Anas platalea*)

Descripción: 36 cm. Castaño rojizo, con pecas negras abundantes. Cabeza y cuello, claros. Pico chato, ancho y muy grande de color negro. Iris blanco. Cubiertas alares de color gris celeste, visibles en vuelo. Hembra de coloración modesta, parduzco grisácea. Iris pardo.

Hábitat: lagunas, esteros, bañados y embalses.

Distribución geográfica: Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Sudeste de Brasil, Uruguay y Argentina, hasta las Islas Malvinas.

Notas de interés: común y abundante en muchos ambientes acuáticos. Suele nadar con el cuello encogido y con su gran pico casi tocando la superficie del agua. Cuando vuela, el bello espejo alar es una de las características que permite identificarlo fácilmente.

PATO PICAZO

(*Netta peposaca*)

Descripción: 43 cm. Negro con brillo violáceo y verde. Pico rosado con punta negra. Iris y carúncula rojos. Flancos grisáceos. Alas por ventral, subcaudales y banda alar, blancas. Hembra y juveniles, pardos con dorso más oscuro. Anillo periocular y garganta blancuzcos. Pico plumizo.

Hábitat: lagunas, esteros, bañados y embalses.

Distribución geográfica: Perú, Bolivia, Paraguay, Sudeste de Brasil, Uruguay, Chile y Argentina, hasta las Islas Malvinas.

Notas de interés: de vuelo rápido y poderoso. Es de fácil identificación por la presencia de la banda alar blanca. Generalmente la hembra vuela delante del macho. Debido a su tamaño, es una presa codiciada por los cazadores.



Foto: Walter E. Cejas

CARANCHO

(*Caracara plancus*)

Descripción: 55 cm. Pardo oscuro, con cuello y pecho blanquecino barrado de negruzco. Corona oscura a manera de "boina". Cola blanca con franja oscura en la punta. Cara roja con fuerte pico plumizo. Base de remeras primarias blancas, muy visible en vuelo.

Hábitat: bosques abiertos, serranías, áreas rurales, poblados y ambientes acuáticos.

Distribución geográfica: toda Sudamérica hasta las Islas Malvinas.

Notas de interés: muy común en nuestros campos donde se lo observa posado en árboles, postes o en el suelo. Es una especie depredadora y de mucha utilidad por su actividad carroñera.



Foto: Walter E. Cejas

CHIMANGO

(*Milvago chimango*)

Descripción: 37 cm. Pardo, más claro en ventral. Mancha clara en extremo de las alas. Rabadilla y cola blancuzcas con leve barrado.

Hábitat: bosques abiertos y arboledas en áreas rurales y urbanas. En llanuras, serranías y ambientes acuáticos.

Distribución geográfica: Bolivia, Paraguay, Sudeste de Brasil, Uruguay, Chile y Argentina, hasta las Islas Malvinas.

Notas de interés: de hábitos carroñero y depredador. Es común en nuestros campos, donde se lo puede ver posado en postes de alambrados. Suele ser confundido con el Carancho, pero su tamaño es menor y su coloración más clara.



Foto: Walter E. Cejas

HALCONCITO COLORADO

(*Falco sparverius*)

Descripción: 28 cm. Dorso con manchitas negras y parte dorsal de la cola, castaño rojizo. Corona plumiza. Bigote, patilla y manchita en la nuca, negros. Cubiertas alares plumizas con pequitas negras. Ventral blancuzco moteado de negro. Hembra con dorso y cola castaño rojizos, barrado de negro. Ventral estriado de negro.

Hábitat: bosques y arbustales abiertos. Áreas rurales y urbanas.

Distribución geográfica: Sudamérica. En Argentina hasta las Islas Malvinas. Notas de interés: como otras especies de halcones y milanos suele mantenerse suspendido en el aire aleteando rápidamente en busca de presas, movimiento que se conoce como "halconeo". Es común observarlo en la copa de arbustos, cables y postes de tendido eléctrico.



Foto: Walter E. Cejas




Foto: Alejandro Earnshaw

GALLARETA LIGAS ROJAS

(*Fulica armillata*)

Descripción: 35 cm. Coloración plumizo oscuro con cabeza y cuello negros. Subcaudales blancas con centro negro. Iris castaño. Pico y escudete triangular amarillo con mancha roja en la unión de ambos. Patas amarillentas pardas con faja roja arriba de la "rodilla" y dedos lobulados verdosos.

Hábitat: embalses, lagunas, bañados y esteros.

Distribución geográfica: Paraguay, Sudeste de Brasil, Uruguay, Chile y Argentina, hasta las Islas Malvinas.

Notas de interés: muy abundante y a veces confundida con patos. Emite fuertes gritos. Construye nidos grandes con hierbas acuáticas y juncos con una rampa de acceso muy notable. Los pichones tienen cabeza desnuda y muy colorida.



Foto: Alejandro Earnshaw

GALLARETA CHICA

(*Fulica leucoptera*)

Descripción: 30 cm. Pico blancuzco con la punta amarillenta y escudete redondeado amarillo o anaranjado. Iris rojizo. Dorsal gris pizarra oscuro, con cabeza y cuello negros. Ventral gris plumizo. Subcaudales blancas con centro negro. Borde posterior del ala, blanco, visible en vuelo. Patas verdosas con dedos lobulados.

Hábitat: lagunas, embalses, esteros y bañados.

Distribución geográfica: Bolivia, Paraguay, Sudeste de Brasil, Uruguay, Chile y Argentina, hasta las Islas Malvinas.

Notas de interés: de hábitos gregarios, esta abundante especie es confundida a veces con los patos. Se alimenta de materia vegetal. El nido es construido principalmente con juncos, donde nacen pichones con cabeza desnuda y muy colorida.



Foto: Walter E. Cejas

GALLARETA ESCUDETE ROJO

(*Fulica rufifrons*)

Descripción: 32 cm. Dorsal gris oscuro con cabeza y cuello negros. Subcaudales blancas con centro negro. Iris pardo. Pico amarillo con base roja y escudete rojo lacre terminado en punta. Cabeza prominente. Patas verdes con dedos lobulados.

Hábitat: embalses, lagunas, bañados y esteros.

Distribución geográfica: Paraguay, Sudeste de Brasil, Uruguay, Chile y Argentina, hasta las Islas Malvinas.

Notas de interés: A veces confundidas con patos. Esta especie está muy asociada a la vegetación acuática emergente como juncos y totoras, donde frecuentemente se refugia. Construye nidos grandes con hierbas acuáticas y juncos. Los pichones tienen cabeza desnuda y muy colorida. Se distingue de las otras dos gallaretas, por la cola más larga y casi siempre erecta lo que hace notable el color blanco en la misma.



Foto: Walter E. Cejas

CARAU (Viuda loca)

(*Aramus guarauna*)

Descripción: 54 cm. Parduzco. Cuello con manchitas blancas en hilera. Pico amarillento recto y largo algo curvado. Patas negruzcas. De lejos parece una bandurria.

Hábitat: variados ambientes acuáticos como bañados, esteros, lagunas y embalses, generalmente cerca de vegetación palustre y árboles.

Distribución geográfica: Sudamérica, excepto Chile. En Argentina hasta el Norte de Río Negro.

Notas de interés: de fuertes gritos onomatopéyicos. Además de ser un buen caminador, posa en árboles. Vuela bajo y con fuertes aletazos que no pasan de la línea del cuerpo. Nidifica entre juncos o en árboles. Consume gran cantidad de caracoles y otros invertebrados, como almejas, cangrejos e insectos, además de sustancias vegetales.

JACANA

(*Jacana jacana*)

Descripción: 22 cm. Coloración general negra con el dorso castaño rojizo. Remeras primarias y secundarias amarillo verdosas, visibles con alas abiertas, las cuales poseen espolones. Pico amarillo con cresta trilobulada, roja. Patas y dedos verdosos, con uñas largas. Los juveniles tienen el vientre y cejas blancos, con el dorso pardo.

Hábitat: lagunas, ríos, bañados y esteros con vegetación flotante.

Distribución geográfica: Sudamérica excepto Chile. En Argentina hasta el norte de La Pampa.

Notas de interés: conocido también como Gallito de Agua, suele encontrarse caminando, favorecido por sus largos dedos y uñas, sobre vegetación acuática flotante como los repollos de agua, donde también nidifica. Allí encuentra además, su alimento: semillas, insectos, crustáceos y pequeños caracoles.



Foto: Walter E. Cejas

TERO REAL

(*Himantopus melanurus*)

Descripción: 35 cm. Ventral, frente y corona, blancos. Nuca, posterior del cuello y dorso, negros. Alas por ventral, blanco y negro. Patas muy largas, rojas. Pico fino, largo y recto, negro.

Hábitat: lagunas, esteros, bañados y costas de embalses.

Distribución geográfica: Sudamérica. En Argentina hasta las Islas Malvinas, excepto Tierra del Fuego.

Notas de interés: muy abundante y común. Los teros reales son fácilmente identificables por su coloración tricolor y por sus vocalizaciones, repetidas "eu..eu..eu", semejantes al ladrido de un perrito.




Foto: Walter E. Cejas

TERO COMÚN

(*Vanellus chilensis*)

Descripción: 31 cm. Dorso pardo oliváceo, con brillo verde y violáceo en cubiertas alares. Fino copete, frente, línea en la garganta y pecho, negros. Resto ventral, blanco. Espolones naranja en alas. Punta de las alas (remeras) y faja en la cola, negras. Iris, pico y patas rojos.

Distribución geográfica: Sudamérica. En Argentina, hasta las Islas Malvinas.

Notas de interés: muy conocido en el campo y en las ciudades. Es criado a veces como mascota en parques y jardines domiciliarios por su comportamiento de centinela, ya que ante la presencia de algún intruso emite su fuerte grito onomatopéyico "teru teru".



Foto: Walter E. Cejas

CHORLITO DE COLLAR

(*Charadrius collaris*)

Descripción: 13 cm. Dorsal pardo rojizo, ventral blanco. Pecho con collar negro. Lados del cuello, canela. Frente blanca, negra y canela. Pico y loral, negros. Patas rosadas.

Hábitat: playas marinas, lagunas, embalses, ríos, bañados y bancos de arena.

Distribución geográfica: Sudamérica. En Argentina hasta Chubut.

Notas de interés: muy inquieto, se desplaza en pareja o en pequeños grupos caminado muy velozmente en busca de alimento que detecta con su vista. Vuelo rápido emitiendo un fuerte sonido "piu piu..pupit".



Foto: Walter E. Cejas



Foto: Walter E. Cejas

PITOTOY CHICO

(*Tringa flavipes*)

Descripción: 23 cm. Pico negro, recto y largo. Iris pardo. Dorso pardo grisáceo. Ventral blanco con estrías en el pecho y cuello. Cola blanca barrada de pardo. Patas largas y amarillas.

Hábitat: bañados, esteros y playas de lagunas, embalses, mar y ríos

Distribución geográfica: nidifica en Norteamérica y llega en primavera a Sudamérica. En Argentina, hasta las Islas Malvinas.

Notas de interés: es una de las aves playeras más abundantes. Aunque son migratorios, cuando aquí finaliza el verano, suelen observarse poblaciones durante todo el año. Posado, se agacha frecuentemente en una actitud como saludando. Emite un sonido similar a "Kiu" y en vuelo "bli bli bli". Otra especie similar, el Pitotoy Grande, de mayor tamaño y pico más largo y apenas curvado hacia arriba, frecuenta los mismos lugares.



Foto: Walter E. Cejas

FALAROPO COMÚN (Chorlo Nadador)

(*Phalaropus tricolor*)

Descripción: 18 cm. En plumaje no reproductivo, dorso gris claro y ventral blanco. En plumaje nupcial, línea rufa y otra negra a los lados del cuello y corona gris. Flancos barrados y bandas dorsales de color rufo. Rabadilla blanca, visible en vuelo. Pico negro, largo y fino. Patas amarillas.

Hábitat: playas e interior de bañados y espejos de agua, principalmente salobres. Además en ríos y embalses.

Distribución geográfica: migratorio desde Canadá y Estados Unidos donde nidifica, llegando en primavera hasta la región patagónica.

Notas de interés: puede nadar ya que posee dedos lobulados. Realiza velozmente giros sobre sí mismo con el fin de remover hasta cerca de la superficie del agua los invertebrados acuáticos que constituyen su alimento. En Mar Chiquita se han registrado individuos todo el año y en algunos años se han contabilizado hasta 500.000 individuos.



Foto: Walter E. Cejas

GAVIOTA CAPUCHO CAFÉ

(*Chroicocephalus maculipennis*)

Descripción: 35 cm. Dorso gris. Ventral y cuello, blancos. Cabeza con capuchón color pardo oscuro. Iris pardo. Anillo periocular blanco. Pico y patas rojos. Zona ventral de la punta de las alas, negruzca con mancha blanca. En plumaje no reproductivo la cabeza es blanca con una manchita parda en zona auricular.

Hábitat: lagunas, bañados, esteros, embalses, áreas rurales y costas del mar.

Distribución geográfica: Chile, Paraguay, Sur y Este de Brasil y Argentina, hasta las Islas Malvinas.

Notas de interés: bullanguera y en grandes bandadas. Es una presencia habitual de grandes lagunas, basurales. En los campos, es común observarla detrás del arado en búsqueda de alimento. Nidifica en colonias, entre juncales, a veces muy cerca de nidos del Cuervillo de Cañada.



Foto: Walter E. Cejas

GAVIOTA CAPUCHO GRIS

(*Chroicocephalus cirrocephalus*)

Descripción: 38 cm. Dorso gris. Ventral, cuello y cola, blancos. Cabeza y garganta gris. Punta de alas negro con dos manchas blancas. Iris blanco amarillento. Pico y patas, rojo. En plumaje invernal, cabeza blanca con mancha auricular y línea nugal gris.

Hábitat: lagunas, embalses, bañados, esteros, ríos, costas marinas y áreas de cultivo.

Distribución geográfica: Ecuador, Perú, Brasil, Uruguay, Chile y Argentina, hasta las Islas Malvinas.

Notas de interés: gregaria y bullanguera. Es una especie agresiva que suele observarse en el campo, detrás de los arados consumiendo insectos, por lo cual es apreciada por los trabajadores rurales.

PALOMA MANCHADA

(*Patagioenas maculosa*)

Descripción: 32 cm. Gris plumizo con alas manchadas de blanco. Cola más oscura. Iris blanco. Patas rosadas.

Hábitat: bosques, arbustales, campos y áreas urbanas.

Distribución geográfica: Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina, hasta el centro de Chubut.

Notas de interés: es una especie muy conocida por estar asociada a las zonas urbanas, en plazas y jardines. En los últimos años ha tenido una notable expansión geográfica y, al igual que la Torcaza, es considerada plaga agrícola.



Foto: Walter E. Cejas

TORCAZA

(*Zenaida auriculata*)

Descripción: 22 cm. Dorso pardo grisáceo, con manchitas negras en alas y cara. Corona plumiza. Iris negro. Plumitas doradas en lateral del cuello. Ventral rosáceo. Hembra con cabeza y ventral parduzcos.

Hábitat: variados ambientes. Áreas rurales y urbanas.

Distribución geográfica: Sudamérica. En Argentina hasta las Islas Malvinas.

Notas de interés: común en zonas urbanas y muy abundante en los campos donde es considerada plaga agrícola. Es la principal pieza buscada por lo cazadores denominados "palomeros".



Foto: Walter E. Cejas

TORCACITA

(*Columbina picui*)

Descripción: 15 cm. Dorso Grisáceo. Ventral blanco rosáceo. Alas negras con visible bandita blanca. Línea negra en cubiertas alares. Hembra parduzca. Plumas externas de la cola, blancas, centrales negras. Iris lila claro.

Hábitat: bosques, áreas rurales y urbanas.

Distribución geográfica: Perú, Chile, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina, hasta Santa Cruz.

Notas de interés: especie muy conocida en algunos lugares con el nombre de Urpilita o "Palomita de la Virgen". Sus vocalizaciones se escuchan a lo largo del día, emitiendo un suave y repetido "uú uú uú".



Foto: Walter E. Cejas

COTORRA COMÚN

(*Myiopsitta monachus*)

Descripción: 27 cm. Coloración verde con pecho gris. Parte de las alas azules. Pico amarillento anaranjado

Hábitat: diversos ambientes de bosques, áreas rurales y urbanas

Distribución geográfica: Bolivia, Sudeste de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, hasta el norte de Chubut.

Notas de interés: fue combatida por considerarse plaga para los cultivos. Utilizada como mascota, lo que generó su introducción y liberación en EEUU y algunos países de Europa donde se la conoce como "cotorra argentina". Construye grandes nidos comunales, siendo la única especie de loro que lo hace con ramitas.



Foto: Walter E. Cejas



Foto: Walter E. Cejas

PIRINCHO (*Guiraguira*)

Descripción: 36 cm. Amarillento canela, con dorso y zona ventral con fino estriado negruzco. Larga cola tricolor: canela, negro y blanco. Iris y pico anaranjados. Copete despeinado.

Hábitat: bosques, arbustales, áreas rurales y urbanas.

Distribución geográfica: Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina, hasta el Noreste de Chubut.

Notas de interés: conocidos con el nombre común de "Urraca" aunque estas pertenecen a una familia biológica distinta. Los pirinchos son muy comunes en campos, parques y jardines, en pequeñas bandadas, volando o comiendo en el suelo.



Foto: Walter E. Cejas

ALICUCU COMÚN (*Megascops choliba*)

Descripción: 22 cm. Dorso gris parduzco con manchas negras. Ventral gris estriado de negro y fino barrado. Cabeza con plumitas eréctiles formando dos "orejitas" (a veces no tan notables). Iris amarillo. Disco facial bordeado de negro. Existe una fase de coloración castaña.

Hábitat: selvas, bosques chaqueño y serrano y arboledas urbanas.

Distribución geográfica: Sudamérica, hasta el límite Sur de San Luis y Mendoza.

Notas de interés: de hábitos crepusculares y nocturnos, es consumidor de lauchas e insectos como algunos "cascarudos" (Coleópteros). Muy oculto entre los árboles suele escucharse sus vocalizaciones "Krrrrr...cucu".



Foto: Walter E. Cejas

LECHUCITA DE LAS VIZCACHERAS (*Athene cunicularia*)

Descripción: 25 cm. Iris amarillo. Dorsal pardo grisáceo con manchas blanquecinas. Ventral blancuzco con barrado pardo en los flancos. Cola barrada de pardo. Garganta y cejas blancas.

Hábitat: áreas rurales abiertas, serranas y de llanura. También en parques urbanos.

Distribución geográfica: toda Sudamérica hasta las Islas Malvinas.

Notas de interés: muy visible, a veces asentadas en postes. Esta lechucita tiene hábitos diurnos y nocturnos. Construye su nido excavando en la tierra o utilizando vizcacheras, a veces compartiendo con vizcachas y otras aves.



Foto: Walter E. Cejas

PICAFLOR COMÚN (*Chlorostilbon aureoventris*)

Descripción: 7 cm. Verde dorado brillante. Garganta con brillo azulado. Abdomen y manchita detrás del ojo, blancos. Pico rojo con punta negra. Base del pico, rosáceo. Cola furcada, azul. Hembra, de color verde más apagado. Ceja, manchita detrás del ojo y puntas de la cola, blancas. Vientre grisáceo.

Hábitat: selvas, bosques, arbustales, áreas rurales y urbanas.

Distribución geográfica: Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina, hasta el Noreste de Neuquén, Sur de La Pampa y de Buenos Aires.

Notas de interés: de veloces movimientos aéreos en todas direcciones, la brillante figura de este colibrí recorre diferentes flores tubulares en plazas, parques y jardines, además de las flores del monte. A veces construye sus nidos debajo de aleros o en casas abandonadas donde coloca 2 pequeños huevitos de color blanco.

MARTÍN PESCADOR CHICO

(*Chloroceryle americana*)

Descripción: 17 cm. Cabeza, copete y dorsal, verdes. Ventral y collar blancos. Banda pectoral ancha rojiza, continuada en flancos. Manchitas blancas en alas. Cola barrada, notable por ventral. Hembra con garganta amarillenta y banda pectoral verde.

Hábitat: lagunas, embalses, ríos, arroyos y bañados. En árboles, arbustos y juncles.

Distribución geográfica: toda Sudamérica. En Argentina hasta Mendoza, La Pampa y Buenos Aires.

Notas de interés: acecha posado en alguna ramita sobre el agua. Se zambulle sumergiendo su cuerpo casi por completo para capturar crustáceos, moluscos y otros peces. Su vuelo es recto casi al ras del agua. Nidifica en barrancas cerca de ríos, construyendo un túnel con un ensanchamiento al final.



Foto: Walter E. Cejas

MARTÍN PESCADOR GRANDE

(*Megaceryle torquata*)

Descripción: 36 cm. Dorsal y cabeza con cresta eréctil, gris azulado. Robusto pico largo, recto y puntiagudo, negro con base amarillenta. Collar blanco y ventral rojizo. Abdomen blanco con fino barrado gris. Hembra con banda pectoral grisácea y parte superior del ala vista por ventral, rufa.

Hábitat: en árboles y arbustos cerca de ríos, lagunas y embalses. También en cables y puentes sobre el agua.

Distribución geográfica: toda Sudamérica hasta tierra del Fuego.

Notas de interés: en vuelo o posado emite un fuerte sonido similar a una matraca, por lo que también se lo conoce por este nombre. Nidifica en barrancas construyendo una galería terminada en una parte ensanchada. Para la captura de peces, se zambulle en el agua casi por completo.



Foto: Walter E. Cejas

CARPINTERO CAMPESTRE

(*Colaptes campestris*)

Descripción: 28 cm. Dorsal y ventral barrado de blancuzco y negro. Cara, garganta y pecho, amarillos. Pico, iris y corona negros. Malar rojo en machos y negro en hembras. Rabadilla blancuzca.

Hábitat: bosques y arbustales chaqueños, además de zonas urbanas y áreas rurales abiertas.

Distribución geográfica: Sudeste de Bolivia, Paraguay, Sur de Brasil, Uruguay y Argentina, hasta el Norte de Patagonia.

Notas de interés: común en áreas abiertas. Este carpintero tiene hábitos arborícolas y terrestres, siendo gran consumidor de hormigas en el suelo a las que captura con su larga lengua pegajosa. Golpea fuertemente con su poderoso pico el tronco de árboles, no sólo para construir su nido, sino también para buscar larvas debajo de las cortezas con las cuales se alimenta.



Foto: Walter E. Cejas

CARPINTERO REAL

(*Colaptes melanochloros*)

Descripción: 23 cm. En la nuca, semicopete rojo. Corona negra. Cara blanca. Malar rojo en machos y negro en hembras. Garganta con estrías negras. Dorsal negro barrado de amarillento. Pecho amarillento moteado de negro. Ventral blancuzco barrado y punteado.

Hábitat: bosques y arbustales chaqueños. Arboledas en zonas urbanas

Distribución geográfica: Bolivia, Paraguay, Noreste, centro y Sur de Brasil, Uruguay y Argentina, hasta el norte de Chubut.

Notas de interés: común en áreas de bosque nativo donde consigue larvas debajo de la corteza de los árboles. Este bullanguero carpintero está muy asociado a zonas urbanas, donde también busca alimento en el suelo, principalmente hormigas, y en bolsas con residuos alimenticios.




Foto: Walter E. Cejas



HORNERO (*Furnarius rufus*)

Descripción: 18 cm. Dorso pardo castaño, cola rufa. Garganta blanquecina. Ventral grisáceo con abdomen blancuzco.

Hábitat: bosques y arbustales abiertos, arboledas cultivadas, plazas, parques y jardines.

Distribución geográfica: Bolivia, Paraguay, Sur de Brasil, Uruguay y Argentina, hasta el Noreste de Chubut.

Notas de interés: muy bullicioso y esbelto al caminar, es bien conocido en campos y zonas urbanas. Considerado símbolo de trabajo, es el ave nacional desde 1927. Macho y hembra construyen anualmente un nido con barro y algunos pastitos que cuando es abandonado suele ser ocupado por jilgueros, golondrinas u otras aves para nidificar.

Foto: Walter E. Cejas



CACHOLOTE CASTAÑO (*Pseudoseisura lophotes*)

Descripción: 23 cm. Gran copete pardo oscuro. Dorso castaño acanelado. Ventral canela claro. Ojo y pico inferior, blancuzcos.

Hábitat: bosques abiertos, arbustales, áreas rurales y urbanas.

Distribución geográfica: Bolivia, Paraguay, Sudeste de Brasil, Uruguay y Argentina, hasta el Este de Neuquén y Norte de Río Negro.

Notas de interés: muy bullanguero, canta a dúo. Construye grandes nidos con ramitas en árboles de plazas y parques. Posee un vuelo lento y ondulado. Además de insectos, preda sobre huevos de otras aves.

Foto: Walter E. Cejas



SOBREPUESTO (*Lessonia rufa*)

Descripción: 11 cm. Negro con el dorso castaño rojizo. Pico y patas, negros. Hembra parduzca, con el dorso acanelado claro.

Hábitat: playas arenosas y barroas de lagunas, bañados, esteros y embalses. Áreas de cultivo.

Distribución geográfica: Sur de Bolivia, Paraguay, Sudeste de Brasil, Uruguay y Argentina, hasta las Islas Malvinas.

Notas de interés: especie migratoria invernal. Es confiado y frecuente en ambientes acuáticos principalmente donde se lo observa corriendo rápidamente en busca de insectos. Posa en alambres, postes, arbustos y plantas de cultivo.

Foto: Walter E. Cejas



PIOJITO TRINADOR (*Serpophaga griseiceps*)

Descripción: 9 cm. Dorso gris plumizo, algo oliváceo. Filetes claros en cubiertas alares. Fina ceja blancuzca que se continúa en la frente. Ventral grisáceo, con abdomen amarillento.

Hábitat: bosques, arbustales y arboledas en zonas urbanas.

Distribución geográfica: Bolivia, Paraguay, Sudoeste de Brasil, Uruguay y Argentina, hasta Noreste de Neuquén y Norte de Río Negro.

Notas de interés: inquieto y muy acrobático, recorre permanentemente las ramas dando pequeños saltitos para capturar insectos y arañas. Parecido a otras especies de piojitos de las que puede diferenciarse por su particular vocalización, semejante a un "pip...trirrrrrrr".

Foto: Walter E. Cejas

CHURRINCHE

(*Pyrocephalus rubinus*)

Descripción: 13 cm. Pico negro. Dorsal negro. Machos con corona, semicopete y ventral, rojo intenso. La hembra tiene el dorso grisáceo, pecho blancuzco con estriado gris y abdomen rosado.

Hábitat: bosques, sabanas, arbustales y arboledas urbanas.

Distribución geográfica: toda Sudamérica hasta el Norte de Chubut.

Notas de interés: migrador desde el Norte. Llega en primavera a nidificar a nuestro país. Captura insectos en el aire realizando un salto elástico y acrobático, posándose en ramitas, alambres y cables del tendido eléctrico.



Foto: Walter E. Cejas

BENTEVEO

(*Pitangus sulphuratus*)

Descripción: 22 cm. Pico y cabeza negros, con corona oculta amarilla. Notable vincha blanca. Dorsal pardo. Ventral amarillo con garganta blanca.

Hábitat: diferentes ambientes acuáticos, rurales y urbanos

Distribución geográfica: Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina, hasta las Islas Malvinas.

Notas de interés: el Benteveo o Bicho feo es uno de los pájaros más conocidos por su habitual presencia y grito onomatopéyico en zonas urbanas. Se alimenta de peces, insectos, roedores y lagartijas como también de restos de alimentos dejados por el hombre.



Foto: Walter E. Cejas

PICABUEY

(*Machetornis rixosa*)

Descripción: 17 cm. Dorsal pardo. Cabeza grisácea con corona oculta, rojizo anaranjada. Ventral amarillo con garganta blancuzca. Pico y patas negros.

Hábitat: bosques abiertos, arbustales, áreas rurales y urbanas.

Distribución geográfica: Sur y Este de Bolivia, Paraguay, Sur de Brasil, Uruguay y Argentina, hasta el Noreste de Neuquén y Norte de Río Negro.

Notas de interés: especie muy común en plazas, parques y jardines, donde se lo observa corriendo para capturar artrópodos o lombrices, también en árboles. Se lo conoce como Jinete o Picabuey porque es habitual verlo posado sobre caballos, vacas o carpinchos.



Foto: Juliana Cejas Medina

MONJITA BLANCA

(*Xolmis irupero*)

Descripción: 17 cm. Blanca, con la punta de las alas y la cola, negras. Pico, ojo y patas, negros.

Hábitat: bosques abiertos, arbustales y arboledas cultivadas, aún en áreas urbanas.

Distribución geográfica: Sudeste de Bolivia, Paraguay, Sur de Brasil, Uruguay y Argentina, hasta el Norte de Río Negro.

Nota de interés: se las suele observar cazando insectos en el aire con un salto casi elástico y vuelo acrobático. Se visualiza desde muy lejos por su color blanco. Emite un corto silbido "fuit..." similar a una persona.



Foto: Walter E. Cejas



Foto: Walter E. Cejas

GOLONDRINA NEGRA

(*Progne elegans*)

Descripción: 18cm. Negra, con brillo azul-purpúreo. Hembra, coloración parda con ventral grisáceo barrado de pardo.

Hábitat: bosques abiertos, serranías, áreas rurales y urbanas. Costas marinas.

Distribución geográfica: migratoria. Toda Sudamérica hasta las Islas Malvinas.

Notas de interés: llega a Córdoba procedente del Norte de Sudamérica, generalmente en septiembre, donde es común observarla además, en edificios de ciudades y pueblos, en puentes y en otras construcciones humanas, donde nidifica. Suele ser muy abundante y consume gran cantidad de insectos en vuelo.



Foto: Walter E. Cejas

GOLONDRINA PARDA

(*Progne tapera*)

Descripción: 16 cm. Dorsal y collar pectoral pardos. Ventral blanco, con manchitas pardas en el centro. Ventral de alas y cola, negruzcos. Pico negro.

Hábitat: bosques abiertos, áreas rurales y urbanas. Puentes y otras construcciones.

Distribución geográfica: toda Sudamérica, hasta las Islas Malvinas.

Notas de interés: especie migratoria del Norte de Sudamérica. En época estival suele ser común y se concentra en grandes números en plazas y arboledas urbanas para dormir. Nidifica en nidos de Hornero, barrancas y huecos de árboles. Entre agradables gorjeos, come insectos en vuelo, y suele posarse en cables y alambrados, junto a otras especies de golondrinas.



Foto: Walter E. Cejas

GOLONDRINA CEJA BLANCA

(*Tachycinetta leucorrhoa*)

Descripción: 13 cm. Ventral, rabadilla, frente y cejas, blancas. Cola levemente furcada. Dorsal azul verdoso brillante. Cola y parte de las alas, pardas. Pico y patas negras. Iris pardo.

Hábitat: lagunas, esteros, bañados, ríos, embalses. Áreas rurales y urbanas.

Distribución geográfica: Bolivia, Paraguay, Sudeste de Brasil, Uruguay, Chile y Argentina, hasta el Norte de Río Negro.

Notas de interés: es una golondrina común y a veces abundante que nidifica en grietas de árboles, entre escombros, en nidos de Hornero o en el interior de caños plásticos, metálicos o de cemento. Captura insectos en vuelo y suele posarse en cables y alambrados.



Foto: Walter E. Cejas

RATONA COMÚN

(*Troglodytes aedon*)

Descripción: 10 cm. Pardo acanelada, con dorso más oscuro. Cola y alas castañas, con fino barrado negruzco. Pico fino y algo curvo.

Hábitat: selvas, bosques, arbustales y arboledas en zonas urbanas.

Distribución geográfica: Sudamérica. En Argentina, hasta las Islas Malvinas.

Notas de interés: inquieta, confiada y "recorredora" de ramitas donde encuentra insectos, arañas y otros artrópodos. Es una especie común en jardines. Conocida por sus bellos y prolongados gorjeos, especialmente en primavera y verano.

TACUARITA AZUL (*Poliophtila dumicola*)

Descripción: 11 cm. Coloración gris azulada, con ventral grisáceo y abdomen blancuzco. Cola negra, algo erecta, con las plumas laterales blancas. Antifaz negro. Hembra más pálida, sin antifaz.

Hábitat: bosques, arbustales y arboledas en zonas urbanas.

Distribución geográfica: Sudeste de Bolivia, Paraguay, Sudeste de Brasil, Uruguay y Argentina, hasta el Este de San Juan, San Luis, Norte y Este de La Pampa y Buenos Aires.

Notas de interés: muy acrobática. De suaves y agradables trinos a veces imitando a otros pájaros, su coloración la hace inconfundible. Generalmente en pequeñas bandadas, recorre las ramas en busca de insectos y otros diminutos artrópodos.



Foto: Walter E. Cejas

CALANDRIA GRANDE (*Mimus saturninus*)

Descripción: 25 cm. Dorsal parduzco grisáceo, con leve estriado de negro. Ceja y ventral blancuzcos, más ocráceo en el vientre. Cola larga semierecta, con las puntas laterales blancas. Filetes blancos en cubiertas alares. Pico apenas curvo.

Hábitat: bosques, arbustales, arboledas cultivadas, plazas y jardines.

Distribución geográfica: Sur y Este de Bolivia, Paraguay, sudeste de Brasil, Uruguay y Argentina, hasta el Noreste de Santa Cruz.

Notas de interés: especie muy conocida en el campo y en zonas urbanas por su notable capacidad de imitar a otras aves. En pequeñas carreritas atrapa insectos y otros invertebrados, además de carne y grasa dejadas por el hombre.



Foto: Walter E. Cejas

JILGUERO DORADO (*Sicalis flaveola*)

Descripción: 12cm. Dorso amarillo oliváceo, estriado de negro. Ventral amarillo dorado. Frente amarillo-anaranjada. Hembra y juveniles, dorso parduzco con estriado negro y ventral gris claro con pecho y flancos estriados.

Hábitat: bosques abiertos, arbustales y arboledas en zonas urbanas.

Distribución geográfica: Sudamérica. En Argentina hasta Río Negro.

Notas de interés: sufre elevadas capturas con fines comerciales para su tenencia en jaulas. De agradables trinos y generalmente en parejas, es común observarlos en lo alto de árboles, arbustos y alambrados. Similar en coloración al Misto, que tiene anillo periorcular amarillento y sin frente anaranjado. Frecuente en grandes bandadas.



Foto: Walter E. Cejas

CHINGOLO (*Zonotrichia capensis*)

Descripción: 12 cm. Dorsal pardo con estrías negras. Corona gris con bandas negras (varía según las razas). Semicollar (collar incompleto) dorsal y lados del pecho, rufos. Ceja y garganta blancas. Ventral grisáceo con flancos acanelados.

Hábitat: variados ambientes naturales, además de zonas urbanas, plazas y jardines.

Distribución geográfica: toda Sudamérica hasta las Islas Malvinas.

Notas de interés: abundante, confiado y muy conocido por sus agradables trinos, a veces con el nombre de "Cachilo". Se desplaza dando pequeños saltitos, consumiendo semillas, insectos y otros invertebrados.



Foto: Walter E. Cejas



Foto: Walter E. Cejas

CARDENAL COMÚN

(*Paroaria coronata*)

Descripción: 17 cm. Cabeza, copete y garganta hasta el pecho, rojos. Ventral blanco. Dorso gris celeste. Pico blancuzco. Iris rojizo.

Hábitat: bosques y arbustales chaqueños, además de zonas urbanas y arboledas cercanas al agua.

Distribución geográfica: Sudeste de Bolivia, Paraguay y Brasil, Uruguay y Argentina, hasta el Norte de la Patagonia.

Notas de interés: por su belleza y melodioso canto es una de las especies más perseguidas para mantenerla en jaulas. Suelen verse en parejas o pequeños grupos en árboles, arbustos, alambrados y caminos.



Foto: Walter E. Cejas

VERDÓN

(*Embernagra platensis*)

Descripción: 20 cm. Pico y patas anaranjados. Dorsal gris oliváceo, con alas y cola verde oliváceo brillante. Ventral gris ocráceo. Juveniles con pico negruzco, ceja amarillenta y plumaje estriado.

Hábitat: arbustales, pastizales y juncales.

Distribución geográfica: Bolivia, Paraguay, Sudeste de Brasil y Argentina, hasta Río Negro.

Notas de interés: fácilmente identificable por su coloración verdosa brillante y su colorido pico. Esta especie emite sus vocalizaciones similares a "pich...pich" desde lo alto de arbustos y pastos. En nuestra provincia suele observarse otra raza, la del Sur, que posee el dorso estriado de negro y el pico naranja con la parte media superior del pico (culmen) negro.



Foto: Walter E. Cejas

TORDO RENEGRIDO

(*Molothrus bonariensis*)

Descripción: 19cm. Negro con brillo violeta en ventral y cuello, y verdoso en alas. Pico negro, cónico. Iris pardo oscuro. Hembra, pardo ocráceo con el dorso más oscuro.

Hábitat: bosques abiertos, arbustales, áreas rurales, campos agrícolas ganaderos y zonas urbanas.

Distribución geográfica: Sudamérica. En Argentina hasta Santa Cruz.

Nota de interés: muy abundantes en nuestros campos y frecuentemente observados sobre el ganado. Es una especie párasita, porque la hembra coloca huevos en nidos de otras especies de aves para que los incuben.

Otra especie similar en comportamiento y coloración, el Tordo Pico Corto, es más opaco, con pico más corto y posee una manchita rojiza poco visible en las axilas.



Foto: Walter E. Cejas

TORDO MÚSICO

(*Agelaioides badius*)

Descripción: 18 cm. Dorso gris parduzco. Borde de las primarias, rufo. Ventral grisáceo. Loral y cola, negros.

Hábitat: bosques abiertos, arbustales, áreas rurales, campos agrícolas ganaderos y zonas urbanas.

Distribución geográfica: Sur de Bolivia, Paraguay, Sudeste de Brasil, Uruguay y Argentina, hasta Chubut.

Notas de interés: especie común y abundante. Se observa en pequeñas bandadas vocalizando agradables trinos en forma alternada. Similar en coloración a la hembra del Tordo Renegrado y a los juveniles del Tordo Pico Corto, de los que se diferencia principalmente por el color negro del loral.

Glosario



Abigarrado: plumaje intensamente moteado

Anillo periocular: hilera de pequeñas plumas que rodean al ojo.

Antifaz: zona oscura alargada que incluye a los ojos.

Auricular: zona lateral de la cabeza donde se encuentra el oído.

Axila: zona de plumas que cubren la parte interna de la unión entre el cuerpo y el ala de un ave.

Banda alar: franja transversal en el ala abierta, generalmente visible sólo en vuelo.

Banda pectoral: ancha franja en el pecho, de color distinto al resto del plumaje ventral.

Barrado: diseño del plumaje con líneas transversales.

Bigote: franja destacada, más o menos estrecha, que nace en las inmediaciones de la mandíbula inferior y se extiende por el borde inferior de la mejilla.

Canela - acanelado: color de la canela; marrón anaranjado.

Capuchón: zona de diferente color que cubre la mayor parte de la cabeza incluyendo al ojo.

Carúncula: abultamiento carnoso ubicado entre la frente y el pico.

Cola furcada: cola con las plumas laterales un poco más largas que las centrales. En forma de "V".

Copete: grupo de plumas o penacho en la parte superior de la cabeza.

Corona: plumas de la parte superior de la cabeza, generalmente de distinta coloración.

Cresta: conjunto de plumas eréctiles en la parte superior de la cabeza.

Cubiertas alares: plumas de menor tamaño, que cubren la parte exterior de alas.

Escudete: zona coloreada y sin plumas que se ubica inmediatamente por detrás del pico y sobre la frente de algunas aves.

Estriado: diseño del plumaje con líneas longitudinales.

Dedos lobulados: dedos con extensión lateral de la membrana, sin llegar a unirse con los demás dedos.

Disco facial: círculo de plumas rígidas y de distinto color que rodea el rostro de las lechuzas.

Dorsal: dorso, conjunto de partes superiores del plumaje. Puede incluir o no la cabeza.

Gregaria: que vive asociada con individuos de su misma o de otra especie. Lo contrario a solitaria.

Iris: parte coloreada del ojo alrededor de la pupila.

Juvenil: ejemplar inmaduro, de tamaño similar al adulto pero con plumaje distinto.

Loral: área comprendida entre el pico y el ojo.

Malar: conjunto de pequeñas plumas destacadas que nace cerca de la mandíbula y se extiende junto al borde de la garganta.

Mimético: de coloración similar al lugar donde vive, permitiéndole pasar desapercibido al confundirse con el medio.

Nucal: zona de la nuca; parte posterior de la cabeza.

Ocráceo: de color ocre, pardo claro.

Onomatopéyico: de onomatopeya, imitación del sonido de un ave.

Patilla: franja longitudinal destacada que se encuentra en la cara por debajo del oído.

Plomizo: coloración similar al plomo; gris azulado.

Plumaje nupcial: plumaje especial que se presenta en el período reproductivo.

Rabadilla: conjunto de plumas que cubren la base de la cola, por dorsal.

Remeras: plumas del ala. Comenzando desde el extremo distal hacia la base se clasifican en primarias, secundarias y terciarias.

Rufo/a: rojizo, color ladrillo.

Semicopete: grupo de plumas en la parte superior de la cabeza menor a un copete.

Subcaudales: plumas que cubren la base inferior de la cola.

Ventral: conjunto de partes inferiores del plumaje.

Vincha: cejas anchas que se unen en la frente y en la nuca rodeando completamente la cabeza.

Bibliografía



- AGENCIA CÓRDOBA AMBIENTE 2004. Áreas Naturales Protegidas, provincia de Córdoba. República Argentina. 122 p.
- CANEVARI, P., CASTRO, G., SALLABERRY, M. y L. G. NARANJO. 2001. Guía de los Chorlos y Playeros de la Región Neotropical. Asociación Calidris. 141 p.
- CEJAS, W. E. 2018. Aves de la provincia de Córdoba, Argentina (Checklist). Ediciones Ecoval-Museo de Zoología. FCEfyN. Universidad Nacional de Córdoba.
- CHÉBEZ, J. C. 2004. Los que se Van. Especies argentinas en peligro. Ed. Albatros. Buenos Aires, 609 p. CHÉBEZ, J. C. 2009. Otros que se Van. Ed. Albatros. Buenos Aires, 577 p.
- BUCHER, E. H. (ed.). 2006. Bañados del Río Dulce y Laguna Mar Chiquita. (Córdoba, Argentina). Academia Nacional de Ciencias (Córdoba, Argentina). 342 p.
- BUCHER, E. H. 1992. Population and conservation status of flamingos in Mar Chiquita, Córdoba, Argentina. Colonial waterbirds, 15: 179-184.
- DE LA PEÑA, M.R. 1987. Nidos y huevos de aves argentinas. Ed. del autor. Santa Fe. DI GIÁCOMO, A. S. (ed.) 2007. Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
- GWYNNNE, J.A., RIDGELY, R. S., TUDOR, G. y M. ARGEL. 2010. Aves Do Brasil. Vol. 1. Pantanal y Cerrado. Editora Horizonte.
- NAROSKY, T. y A. BOSSO. 1995. Manual del observador de aves. Ed. Albatros, Buenos Aires, 254 p. NAROSKY, T. y S. SALVADOR. 1998. Nidificación de las aves argentina. Tyrannidae. Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
- NAROSKY, T. y W. E. CEJAS. Aves de Córdoba y Centro de Argentina. Guía de Campo. Ecoval Ediciones. (en prep.)
- NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 2010. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Edición Total. Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires, 432 p.
- NORES, M. 1996. Avifauna de la provincia de Córdoba. Biodiversidad de la Provincia de Córdoba (E. di Tada y E.H. Bucher eds.), pp. 255–337. Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
- NORES, M. y D. YZURIETA. 1980. Aves de ambientes acuáticos de Córdoba y centro de Argentina. Secretaría de Agricultura y Ganadería, Córdoba, Argentina.
- NORES, M., YZURIETA, D. y R. MIATELLO. 1983. Lista y distribución de las aves de Córdoba, Argentina. Boletín de la Academia Nacional de Ciencias 56: 1–114. RODRIGUEZ MATA, J., ERIZE F. y M. RUMBOLL. 2006. Guía de campo Collins. Aves de Sudamérica, no Passeriformes. Letemendia Casa Editora. 384 p.
- YZURIETA, D. 1995. Manual de reconocimiento y evaluación ecológica de las aves de Córdoba. Ministerio de Agricultura y recursos renovables. Gobierno de Córdoba. 396 p

Descripción de las especies: Walter E. Cejas (wecejass@yahoo.com.ar). Agencia Córdoba Turismo SEM
Idea y diseño general: Erio Curto (erio_curto@yahoo.com). PROMAR - CZA – UNC

Nota de los autores: esta guía fue elaborada originalmente en el marco del Proyecto PROFODE del Ministerio de Turismo Nación.

Fotos de tapa y contratapa: Walter E. Cejas

Citar como:

CEJAS, W.E. y E. CURTO. 2018. Aves de Ansenuza. Especies comunes y sitios para su avistaje. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba, Argentina.

Laguna Mar Chiquita

Campo
Mare

La Para

17

Va. del Totoral
(cruce RN 9)
110 km.

C. Bahía
de Ansenúza

C. Laguna
del Plata

Rio Primero (Suquia)

Playa
Grande

L. de los
Indios

Miramar

Marull

Bañearia

17

Bañeario
El Puente

Rio Segundo

3



10 0 10Km

- Ruta Provincial
- Camino de tierra
- Área de reserva
- Observatorio
- Sitio para observación

Sunchales
(cruce RN 34)
103 km.





TODLO QUE QUERÉS,
TODLO AÑO



Web: www.cordobaturismo.gov.ar
Facebook: www.facebook.com/turismocba
Twitter: www.twitter.com/turismocba
YouTube: www.youtube.com/agenciabaturismo
Pinterest: www.pinterest.com/turismocba
Flickr: www.flickr.com/turismocba
App: Córdoba Turismo

www.cordobaturismo.gov.ar



Ministerio de Turismo
Presidencia de la Nación



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA



**ENTRE
TODOS**